

# Acetaminophen Dosage Chart FOR PAIN AND/OR FEVER

Weight Range	Usual Dosage in mg	Infant Drops 0.8 ml = 80 mg 1 dropper = 0.8 ml	Children's Liquid 5 ml = 160 mg 5 ml = 1 teaspoon	Children's Chewable Tablets 80 mg each	Junior Strength Chewable Tablets 160 mg each	Adult Strength Tablets 325 mg each
6-11 lbs.	40 mg	½ dropper	¼ teaspoon	_____	_____	_____
12-17 lbs.	80 mg	1 dropper	½ teaspoon	_____	_____	_____
18-23 lbs.	120 mg	1½ droppers	¾ teaspoon	1½ tablets	_____	_____
24-35 lbs.	160 mg	2 droppers	1 teaspoon	2 tablets	1 tablet	_____
36-47 lbs.	240 mg	3 droppers	1½ teaspoons	3 tablets	1½ tablets	_____
48-59 lbs.	320 mg	4 droppers	2 teaspoons	4 tablets	2 tablets	_____
60-71 lbs.	400 mg	5 droppers	2½ teaspoons	5 tablets	2½ tablets	_____
72-95 lbs.	480 mg	_____	3 teaspoons	6 tablets	3 tablets	_____
96 lbs. or more	640-650 mg	_____	4 teaspoons	8 tablets	4 tablets	2 tablets

- **Always use an accurate measuring dropper, syringe or cup!**
- **Only use the infant dropper in the package to give an infant drops!**
- Do not use kitchen spoons, as these are not a standard size or measure.
- Do not give acetaminophen with another medicine that also contains acetaminophen.
- You may give a dose every four hours, up to five doses in 24 hours. Do not give more than the dosage chart says.
- Do not take with alcohol. Some medicines, such as liquid cold medicine, could contain alcohol. Taking acetaminophen with alcohol can cause liver damage.
- Talk to your infant's health care provider before giving acetaminophen if your infant is younger than 6 months old.
- **Do not give both ibuprofen and acetaminophen at the same time.**
- **Taking too much acetaminophen can cause permanent liver damage or death!**
- **Store acetaminophen in a cool dry area, away from the reach of children.**
- Contact your child's health care provider **RIGHT AWAY** if your child takes too much acetaminophen!



South Carolina Department of Health and Environmental Control

[www.scdhec.gov](http://www.scdhec.gov)

# Table de dosificación de acetaminofén PARA EL DOLOR Y/O LA FIEBRE

Peso	Dosis normal (en mg)	Gotas para bebés 0.8 ml = 80 mg 1 gotero = 0.8 ml	Líquido para niños 5 ml = 160 mg 5 ml = 1 cucharita	Comprimidos masticables para niños 80 mg por comprimido	Comprimidos masticables "Junior Strength" 160 mg por comprimido	Comprimidos para adultos 325 mg por comprimido
6-11 lbs.	40 mg	½ gotero	¼ cucharadita	_____	_____	_____
12-17 lbs.	80 mg	1 gotero	½ cucharadita	_____	_____	_____
18-23 lbs.	120 mg	1½ goteros	¾ cucharadita	1½ comprimido	_____	_____
24-35 lbs.	160 mg	2 goteros	1 cucharadita	2 comprimidos	1 comprimido	_____
36-47 lbs.	240 mg	3 goteros	1½ cucharadita	3 comprimidos	1½ comprimido	_____
48-59 lbs.	320 mg	4 goteros	2 cucharaditas	4 comprimidos	2 comprimidos	_____
60-71 lbs.	400 mg	5 goteros	2½ cucharaditas	5 comprimidos	2½ comprimidos	_____
72-95 lbs.	480 mg	_____	3 cucharaditas	6 comprimidos	3 comprimidos	_____
96 lbs. y más	640-650 mg	_____	4 cucharaditas	8 comprimidos	4 comprimidos	2 comprimidos

- **¡Utilice siempre un gotero, una jeringa o una taza medidora!**
- **Para medir las gotas para el bebé, use solamente los goteros que vienen con el medicamento.**
- No use cucharas de la cocina. Como las cucharas tienen tamaños diferentes, puede ser que usted le dé a su hijo demasiado o muy poco medicamento.
- No le dé acetaminofén con otro medicamento que contenga acetaminofén.
- Puede darle una dosis a cada 4 horas, hasta un máximo de 5 dosis en un período de 24 horas. No le dé más de la dosis indicada en la tabla.
- Evite tomar alcohol. Algunos medicamentos, como los jarabes para el resfriado, pueden contener alcohol. Tomar acetaminofén con alcohol puede dañar al hígado.
- Si su bebé es menor de 6 meses de edad, hable con el doctor de su bebé antes de darle acetaminofén.
- **No le dé ibuprofén y acetaminofén al mismo tiempo.**
- **¡Una sobredosis puede causar daño permanente al hígado o la muerte!**
- **Mantenga el acetaminofén en un área fresca y seca, fuera del alcance de los niños.**
- Comuníquese con el proveedor de cuidado médico **INMEDIATAMENTE** si su hijo toma demasiado acetaminofén.